

Diverticulite colique aigue simple : Traitement symptomatique versus traitement antibiotique

S. Ben Rhouma¹, H. Elloumi¹, R. Zmerli¹, W. Triki², E. Mchirgui³, S. Bouchoucha², I. Cheikh¹

¹Service de Gastroentérologie, Hôpital de Bizerte, Tunisie; ²Service de chirurgie générale, Hôpital de Bizerte, Tunisie; ³Service des urgences, hôpital de Bizerte, Tunisie

Introduction:

La diverticulite colique aiguë (DA) est une pathologie fréquente en particulier chez les personnes âgées. On assiste, récemment, à un changement de la prise en charge de cette pathologie avec une tendance vers une restriction des indications du traitement chirurgical. De même, une réduction de la prescription d'antibiothérapie est l'attitude actuellement adoptée. L'objectif de l'étude était de comparer l'efficacité de l'antibiothérapie au traitement symptomatique.

Patients et méthode:

Il s'agit d'une étude rétrospective, comparative étalée sur 3 ans incluant les patients atteints d'une DA simple hospitalisés à l'hôpital de Bizerte. Les patients colligés ont été répartis en deux groupes : les patients traités par antibiothérapie (groupe 1) et les malades qui ont bénéficié d'un traitement symptomatique (groupe 2). L'évaluation de l'efficacité du traitement était jugée sur le délai de rémission, la survenue de complications ou de récurrence de la DA, le recours à la chirurgie et la mortalité.

Résultats:

175 patients atteints de DA ont été colligés. Il étaient répartis en 57,2% hommes et 42,8% femmes. L'âge moyen était 62 ans (51- 85 ans).

Groupe 1: 120 patients ayant bénéficié d'un traitement par antibiothérapie

Groupes 2: 55 patients n'ayant pris qu'un traitement symptomatique (figure 1).




Figure 1: Répartition des patients en deux groupes selon les modalités thérapeutiques

L'efficacité du traitement antibiotique était comparable à celle du traitement symptomatique: le délai moyen de rémission, la fréquence de survenue de complications, la fréquence de survenue de complications, le recours à la chirurgie ainsi que la mortalité étaient comparables entre les deux groupes (tableau 1).

Tableau 1: Comparaison entre les deux groupes de patients

	Gpe 1	Gpe2	P
Délais moyen de rémission	12 j (6-35 j)	14 j (16-30 j)	0,14
Complications	2,7%	3,2%	0,43
Récidive	4,1%	3,6%	0,32
Chirurgie	3,7%	4,3%	0,21
Mortalité	1,1%	0,8%	0,41

Conclusion:

Cette étude a montré que le traitement symptomatique donne des résultats comparables au traitement antibiotique en cas de DA simple.