

L'infection à VIH chez l'enfant : expérience du service des Maladies Infectieuses la Rabta

R. Abdelmalek¹, S. Kacem², A. Berriche¹, L. Ammari¹,
S. Aissa¹, A. Ghoubantini¹, B. Kilani¹, F. Kanoun¹, H.
Tiouiri Benaïssa¹

¹Service des maladies infectieuses, EPS la Rabta

²Service de néonatalogie, C N M N de Tunis

Introduction

-
- ▶ Infection pédiatrique selon les données OMS, fin 2010
 - ▶ 3,4 millions d'enfants VVIH au monde
 - ▶ 390 000 nouveaux cas en 2010
 - ▶ 250 000 décès en 2010
 - ▶ Objectif 2015: 0 cas pédiatrique
 - ▶ En Tunisie,
 - ▶ moyenne nationale 4-5 enfants/an
 - ▶ De 1985 à 2011: 111 cas dont 32 hémophiles
 - ▶ Infection méconnue en pédiatrie
 - ▶ Répercussions psychologiques, sociales et d'avenir

Patients


- ▶ Critères d'inclusion
 - ▶ Tous les enfants ≤ 15 ans
 - ▶ Suivis pour infection à VIH
 - ▶ Au service des maladies infectieuses de Tunis
 - ▶ De 1985 à 2013

Résultats

Epidémiologie


48 enfants (13 avant 2000; 35 après 2000)

Sexe



Epidémiologie


Tranches d'âge



Age moyen: 5,7 ans (0,1-15 ans) à la découverte


Epidémiologie

Voies de transmission




Epidémiologie


Statut social des enfants




Statut des mères à la naissance



Circonstance de découverte



Infections opportunistes



Antirétroviraux

- ▶ Prescription ARV: 38 cas (79,16%)
 - ▶ 28 trithérapies bien conduites
 - ▶ 6 trithérapies irrégulières
 - ▶ 4 mono ou bithérapie: avant 2000

Evolution

- ▶ Décès
 - ▶ 19 (39,5%)
 - ▶ Age: 10,78 ans (1-35)
- ▶ Vivants
 - ▶ 27 PVVIH
 - ▶ Age actuel : 16,13 ans (1,1-39,5)
- ▶ Scolarité : 24 cas
 - ▶ Primaire : 12
 - ▶ Secondaire: 11
 - ▶ Université : 1

Commentaires et conclusion

-
- ▶ L'infection pédiatrique est grave
 - ▶ Répercussions sociales, croissance, insertion
 - ▶ Diagnostic parfois tardif si les parents sont méconnus
 - ▶ La mortalité importante

 - ▶ Les formulations pédiatriques sont limitées en Tunisie

 - ▶ Prise en charge complexe

 - ▶ Intérêt de la prévention de la transmission mère enfant
 - ▶ Dépistage systématique de l'infection à VIH
 - ▶ Programmation des grossesses chez les FVVIH

