

LART: Données de 2016

Salmonella

N=85

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches	Souches résistantes aux C3G Nb (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	23	0 (0)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	14	0 (0)
Hôpital d'enfants de Tunis	14	0 (0)
Hôpital la Rabta	25	0 (0)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	0	0 (0)
Hôpital Aziza Othmana	1	0 (0)
Hôpital Abderrahmen Mami-Ariana	4	0 (0)
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	4	0 (0)
Total	85	0 (0)

Distribution des souches de *Salmonella* selon le prélèvement (N=87)

	Nombre	%
Selles	27	31,0
Hémocultures	28	32,3
Urines	18	20,7
Abcès/pus	7	8,0
Ponctions	6	6,9
Autres	1	1,1

*: autres : 1 biopsie

Distribution des souches de *Salmonella* selon les services (N=85)

	Nombre	%
Médecine	27	31,8
Pédiatrie	21	24,7
Chirurgie	14	16,5
Réanimation	3	3,5
Onco-hématologie	8	9,4
Ambulatoire	11	12,9
Gynécologie	1	1,2

Distribution des souches de *Salmonella* selon le sérotype (N=85)

	Nombre	%
S. Typhi	2	2,4
S. Enteritidis	13	15,3
S. Typhmuri	4	4,7
<i>Salmonella</i> spp.	57	67,1
Autres*	9	10,6

*autres sérotypes: BRENEY, ANATUM, MBANDAKA, MUENCHEN, LINDERBURG, SAINT PAUL, S. Kentucky(1), S. Schwarzengrund (1), S. Anatum (2)

Taux de résistance aux antibiotiques de *Salmonella spp* (N=75)

Antibiotiques	Nb	%R	%R+I
Amoxicilline	73	20,5	21,9
Amoxicilline – Acide clavulanique	75	9,3	10,7
Céfalotine	15	0,0	7,1
Cefotaxime / Ceftazidime	75	0,0	0,0
Imipénème	74	0,0	0,0
Gentamicine	57	0,0	0,0
Amikacine	72	1,4	1,4
Ac nalidixique*	65	49,2	53,8
Cotrimoxazole	65	18,5	18,5
Chloramphénicol	65	6,2	6,2
Tétracycline	40	17,5	17,5

*: la résistance est croisée aux fluoroquinolones

Évolution de résistance aux quinolones

Ac nalidixique

