

LART: Données de 2015

A. baumannii

N=889

Répartition des souches d'*A.baumannii* selon les centres

Centre	Nombre (%) de souches	Pourcentage de souches résistantes à l'imipénème
Hôpital Habib Bourguiba de Sfax	281 (31.6)	69.7
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	114 (12.8)	84.2
Hôpital d'enfants de Tunis	52 (5.8)	61.5
Hôpital la Rabta	217 (24.4)	80.1
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	43 (4.8)	27.9
Centre de greffe de moelle osseuse	6 (0.6)	83.3
Hopital Abderrahmen Mami Ariana	174 (19.5)	83.3
Hôpital Aziza Othmana	2 (0.2)	100
Total	889	74.4

Distribution des souches de *A. baumannii* selon le prélèvement

Prélèvement	Nombre	%
Urines	166	17.8
Prélèvements pulmonaires	413	44.4
Ponctions	21	2.3
Hémocultures	131	14.1
Pus	76	11.1
Matériels	82	8.8
Total	889	100

Distribution des souches de *A. baumannii* selon les services

Service	Nombre	%
Chirurgie	163	18
Médecine	111	12.3
Gynécologie	13	1.4
Néonatalogie	48	5.3
Pédiatrie	64	7.1
Ambulatoire	38	4.2
Réanimation	454	50.4
Onco-hématologie	11	1.2
Total	901	100

Taux de résistance aux antibiotiques d' *A. baumannii*

	Total N= 930			Hémocultures N=131			Pulmonaire N=413		
	nombre	%R	% R+I	nombre	%R	%R+I	nombre	%R+I	%R
Ticarcilline / Pipéracilline	821	84.7	86.2	113	86.7	87.6	362	90.3	60.8
Pipéracilline+ Tazobactam	655	81.1	84.4	85	75.3	80.0	283	88.3	67.5
Céftazidime	712	82.9	90.6	91	83.5	89.0	329	89.1	59.6
Céfépime	718	82.5	90.3	103	82.5	90.2	301	77.4	77.7
Imipénème	804	78.2	80.8	108	85.2	86.1	356	94.1	61.2
Gentamicine	634	76.3	76.3	76	80.3	80.2	281	81.5	47.3
Tobramycine	524	72.9	72.9	65	76.9	76.9	231	91.8	52.4
Amikacine	731	65.8	67.9	102	59.8	63.7	323	70.3	52.6
Ciprofloxacine	739	85	85.5	102	82.4	82.3	335	80.3	57.9

Souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipénème

Antibiotiques	Nombre de souches testées	R		R+I	
		N	%	N	%
Ticarcilline/ Pipéracilline	620	620	100	620	100
Pipéracilline+Tazobactam	585	585	100	585	100
Céftazidime	534	534	100	534	100
Céfepime	525	525	100	525	100
Gentamicine	499	450	90.2	450	90.2
Tobramycine	410	347	84.6	347	84.6
Amikacine	464	455	83.2	469	83.2
Ciprofloxacine	560	556	99.3	556	99.3

Prévalence des souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les services

Service	Nombre	%
Chirurgie	122	74.7
Médecine	52	46.8
Néonatalogie	33	68.8
Pédiatrie	46	71.9
Ambulatoire	18	47.4
Réanimation	383	84.4
Onco-hématologie	9	81.8
Total	757	74.3

Prévalence des souches de *A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les prélèvements

Prélèvement	Nombre	%
Urines	100	60.2
Prélèvements pulmonaires	331	80.1
Ponctions	15	71.4
Hémocultures	95	72.5
Pus	76	64,1
Matériels	73	89
Total	690	74.2