

LART: Données de 2018

Streptococcus pyogenes
(N= 190)

Répartition des souches selon les centres

Centre	Nombre de souches (%)
Centre hospitalo-Universitaire de Sfax (Hôpitaux Hédi Chaker et Habib Bourguiba)	90 (47,4)
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	25 (13,2)
Hôpital d'enfants de Tunis	20 (10,5)
Hôpital la Rabta	8 (4,2)
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	41 (21,6)
Hôpital Aziza Othmana	1 (0,5)
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse	0 (0,0)
Hôpital Abderrahmen Mami Ariana	5 (2,6)
Total	190

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon le prélèvement (N= 190)

	Nombre	%
Hémocultures	12	6,3
Pus	154	80,6
ORL	9	4,7
Ponctions	6	3,1
Autres*	10	5,2

* 2 pulmonaires, 2 PV, 4 matériel , 1 os, 1 ophtalmo,

Distribution des souches de *S. pyogenes* selon les services (N= 190)

Services	Nombre	%
Chirurgie	92	48,4
Médecine	57	30
Gynécologie	1	0,5
Pédiatrie	25	13,2
Ambulatoire	13	6,8
Réanimation	2	1,1

Taux de résistance aux antibiotiques de *S. pyogenes*

	Nombre	%R	%R+I
Pénicilline G	168	0,0	0,0
Gentamicine (haut niveau)	156	2,6	2,6
Erythromycine	169	4,1	4,7
Clindamycine	148	2,0	2,0
Pristinamycine	149	0,0	0,0
Vancomycine	158	0,0	0,0
Chloramphénicol	152	0,0	0,0
Tétracycline	146	80,1	80,8
Levofloxacine	168	2,4	2,4
Linézolide	139	0,0	0,0

Les catégories I, sont considérée S à forte posologie

Evolution de la résistance du *S. pyogenes* à l'Erythromycine

