

LART: Données de 2022

A. baumannii

N=1033

Répartition des souches d'*A.baumannii* selon les centres

Centre	Nombre (%) de souches	Pourcentage des souches résistantes à l'imipénème
Hôpital Habib Bourguiba de Sfax	301(29,1)	91,4
Hôpital Charles Nicolle de Tunis	115(11,1)	79,4
Hôpital Farhat Hached Sousse	91 (8,8)	72,5
Hôpital d'enfants de Tunis	22 (2,1)	40,9
Hôpital la Rabta	-	-
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie	19(1,8)	68,4
Centre de greffe de moelle osseuse	5 (0,5)	0
Hopital Abderrahmen Mami Ariana	160 (15,5)	43,1
Centre de traumatologie et des grands brûlés	217 (21)	88,9
Hôpital Aziza Othmana	1 (0,1)	0
Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir	102(9,9)	86,3
Total	1033(100)	77,8

Distribution des souches de *A. baumannii* selon le prélèvement

Prélèvement	Nombre	%
Urines	127	11,7
Prélèvements pulmonaires	439	40,3
Ponctions	23	2,1
Hémocultures	243	22,3
Pus	130	11,9
Matériel	99	9,1
Autres*	3	0,3
Total	1090	100

*: 3 LCS

Distribution des souches de *A. baumannii* selon les services

Service	Nombre	%
Chirurgie	192	18,4
Médecine	65	6,2
Gynécologie	7	0,7
Néonatalogie	53	5,1
Pédiatrie	37	3,5
Ambulatoire	15	1,4
Réanimation	635	60,9
Urgences	19	1,8
Onco-hématologie	10	1
Total	1043	100

NB: Prévalence élevée dans les urgences et les USI

Taux de résistance aux antibiotiques d' *A. baumannii*

	Total N=1090		Hémocultures N=243		Pulmonaire N= 439	
	nombre	%R	nombre	%R	nombre	%R
Ticarcilline	968	80,8	217	89,9	355	93,2
Pipéracilline	785	88,2	208	89,4	251	98,0
Pipéracilline+ Tazobactam	881	89,1	229	89,5	358	94,4
Céftazidime	906	80,5	226	88,1	320	92,8
Céfépime	842	74,7	187	80,7	307	81,1
Imipénème	927	79,5	231	86,1	325	91,7
Gentamicine	769	81,3	185	84,3	289	89,6
Tobramycine	671	73,6	145	80,7	235	86,8
Amikacine	899	72,7	203	79,3	327	86,5
Ciprofloxacine	835	80,4	199	87,9	296	93,6
Cotrimoxazole	609	69,5	165	69,7	216	80,6

Souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipenème

Antibiotiques	R	
	N	%
Ticarcilline	758	100
Pipéracilline	680	100,
Pipéracilline+Tazobactam	759	100
Céftazidime	751	100
Céfepime	698	100
Gentamicine	656	97,4
Tobramycine	563	93,6
Amikacine	740	91,2
Ciprofloxacine	692	98,8
Cotrimoxazole	516	78,3
colistine	342	3,5

Prévalence des souches d'*A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les services

	Nombre de souches imipénème résistantes	Nombre total de souches	%
Chirurgie	157	192	81,8
Médecine	29	65	44,6
Gynécologie	5	7	71,4
Néonatalogie	41	53	77,4
Pédiatrie	15	37	40,5
Ambulatoire	5	15	33,3
Réanimation	538	635	84,7
Urgences	11	19	57,9
Onco-hématologie	4	10	40
Total	818	1043	78,4

NB: Prévalence élevée dans les urgences et les USI

Prévalence des souches de *A. baumannii* résistantes à l'imipénème selon les prélèvements

	Nombre de souches imipénème - résistantes	Nombre total de souches	%
Urines	47	89	52,8
Prélèvements pulmonaires	260	307	84,7
Ponctions	13	16	81,3
Hémocultures	110	141	78
Pus	83	106	78,3
Matériels	74	90	82,2
Autres	3	3	100
Total	590	753	78,4

Autres: LCS

Evolution annuelle de la résistance de *A.baumannii* à l'imipénème et à la colistine

